

FICHA TÉCNICA

ENZIGROW FORTE®

(Corrector Metabólico Nutricional)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

ENZIGROW FORTE® es el primer corrector metabólico nutricional del mercado, que debido a su innovada formulación mejora la bioquímica sistémica de la planta para lograr una optimización fisiológica que se refleja en:

- La optimización de todos los procesos fisiológicos de la planta como absorción de agua y nutrientes, fotosíntesis, transpiración, transporte floemático y acumulación de reservas. Todas estas mejoras, permiten incrementar el rendimiento de los cultivos y mejorar la calidad de los frutos u órganos cosechables (tubérculos, bulbos y raíces reservantes).
- Superar los efectos del estrés producidos por altas o bajas temperaturas, sequías, inundaciones, heladas, granizadas, salinidad, etc; debido a una eficiente compensación metabólica debido al aporte de aminoácidos libres y folcisteína que evita los efectos dañinos del estrés.

Contenido:

AATC (Folcisteína)	20 g/L
Ácido fólico	0.1 g/L
Aminoácidos totales	430 g/L
Aminoácidos Libres	380 g/L
Total Nitrógeno	100 g/L
Nitrógeno Amoniacal	20 g/L
Nitrógeno Orgánico	60 g/L
Nitrógeno Ureico	20 g/L
Carbono Orgánico	310 g/L
pH	5.0 - 6.0
Densidad	1.25 ± 0.02 g/mL

BENEFICIOS DE ENZIGROW FORTE.

- **Enzigrow Forte®** posee el más alto contenido de aminoácidos libres levógiros (380g/L) del mercado. Sus aminoácidos libres (no ligados) y por tanto son totalmente disponibles para que la planta pueda construir las proteínas que ésta necesite para activar crecimiento, formar enzimas de síntesis o producir proteínas de defensa contra enfermedades.
- **Enzigrow Forte®** a su vez aporta un **alto contenido de Folcisteína - 20g/L** (Ácido N-Acetyl Thiazolidin-4-carboxílico-AATC) más ácido fólico, que le permite incrementar rápidamente la concentración de prolina (aminoácido antiestresante) y la formación de grupos tioles (con azufre) que

tienen la propiedad de ser un poderoso antioxidante que se forma de manera natural, las que sirven para acelerar y aumentar la eficiencia de todos los procesos fisiológicos.

- **Enzigrow Forte®** permite acelerar el crecimiento de la planta, mejora la floración, la polinización, el cuajado y el llenado de frutos.
- **Enzigrow Forte®** por su fórmula única y concentrada se convierte en el más poderoso antiestresante del mercado debido a su rápida acción para revertir los efectos negativos de cualquier estrés.

RECOMENDACIONES DE USO.

RECOMENDACIONES DE USO PARA APLICACIONES AL FOLLAJE:

CULTIVO	DOSIS (20 L)	DOSIS (200 L)	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Algodón	30- 50 cc	300-500 cc	-	1. En botones florales 2. Inicio de botoneo
Maíz, arroz, cebada y trigo.	30- 50 cc	300-500 cc	-	1. Al estadio de 3-5 hojas. 2. Al embuchado
Ajo, cebolla, zanahoria, betarraga, poro, nabo.	30 - 50 cc	300-500 cc	1.0- 2.0	1. Al estadio de 4 a 5 hojas 2. Al inicio del bulbeo.
Caña de azúcar	30 - 50 cc	300-500 cc	-	Tras establecimiento plantación ó tras corte para estimular brotación, repetir a los 25-30 días.
Flores	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. Al estadio de 4 a 5 hojas 2. En pre-floración
Cítricos: Mandarina, naranja, toronja, tangelo, limón. Caducifolios: uva, manzana, peral, ciruelo, y demás caducifolios. Arándano, palto, mango, fresa, papayo, banano ó plátano, café, cacao, lúcuma, piña, maracuyá, granadilla, granado, pecano, aguaymanto, higo, olivo y demás frutales.	30 - 50 cc	300-500 cc 2 - 4L/Ha	2.0- 4.0	1. En pre-floración. 2. Al cuajado de frutos. 3. Aplicar 30 días después y repetir 3 semanas después.
Fresa			1.0 - 1.5	
Espárrago	30 - 50 cc	300-500 cc	2.0- 4.0	1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. 2. Una segunda aplicación, 30 días después. 3. Una tercera aplicación, 30 días antes del corte.

CULTIVO	DOSIS (20 L)	DOSIS (200 L)	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Ajés, pimientos, tomate, rocoto, piquillo, pprika, pimiento morrn, aj jalapeo y dems ajs, marigold, alcachofa y fresa.	30 - 50 cc	300-500 cc	1.0- 2.5	1. En prefloracin. 2. Dos a tres aplicaciones ms con intervalos de 3 a 4 semanas.
Papa, camote, yuca	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. Al estadio de 4 a 5 hojas verdaderas. 2. Dos aplicaciones con un intervalo de 3 semanas.
Alfalfa y pastos	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. Despus del corte, cuando tenga 5 cm de altura. 2. Despus aplicar cada 2 a 3 semanas para activar crecimiento.
Leguminosas: Arveja, caup, habas, garbanzo, pallar, frijol, vainita, holntao.	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 2. Al inicio de floracin 3. La tercera aplicacin al llenado de las vainas.
Brcoli, coliflor, col, col de Bruselas y dems crucferas. Tabaco y t	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. A partir de 7 das despus del trasplante. 2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 3. La tercera 15 das despus de la segunda aplicacin.
Cucurbitceas: Zapallo, meln, pepinillo, berenjena y dems cucurbitceas	30 - 50 cc	300-500 cc	-	1. A las 2 semanas de sembrado. 2. Repetir a los 15 das 3. Inicios de botn floral 4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos de 2 a 3 semanas.

RECOMENDACIONES DE USO PARA APLICACIONES AL SUELO.

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Ctricos: Mandarina, naranja, toronja, tangelo, limn.	2.0 - 4.0	1. En pre-floracin. 2. Al cuajado de frutos. 3. Aplicar 30 das despus y repetir 3 semanas despus.
Caducifolios: uva, manzana, peral, ciruelo, granado, pecano y dems caducifolios.		
Arndano		
Palto, Mango		
Fresa	1.0 - 1.5	
Esprrago	2.0 - 4.0	1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. 2. Una segunda aplicacin, 30 das despus. 3. Una tercera aplicacin, 30 das antes del corte.

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Ajés, pimientos, tomate, rocoto, piquillo, páprika, pimiento morrón, ají jalapeño y demás ajés, marigold, alcachofa y fresa.	1.0 - 2.5	1. En prefloración. 2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos de 3 a 4 semanas.
Ajo, cebolla	1.0 - 2.0	1. Al estadio de 4 a 5 hojas 2. Al inicio del bulbeo.

COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO.

Enzigrow Forte® posee un pH entre 6 y 7 que le permite ser mezclado con otros productos de la Línea Nutrizium y con plaguicidas sin problemas de precipitación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados, por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.



RESPONSABILIDAD CIVIL El titular del Producto garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.