

FICHA TÉCNICA

MURETY 300 SC

(Chlorantraniliprole + Thimethoxam)

N° de Registro: PQUA N° 3211 – SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

MURETY 300 SC es un insecticida conformado por dos ingredientes activos cuyo mecanismo de acción se complementan; el chlorantraniliprole como modulador del receptor de la rianodina con Acción nerviosa y muscular, y el Thiamethoxam como modulador competitivo del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR).


- **Ingrediente activo:** Chlorantraniliprole + Thiamethoxam
- **Concentración:**

Chlorantraniliprole	100 g/L
Thiamethoxam	200 g/L
Aditivos para completar	1L
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC).
- **Grupo Químico:** Diamida + Neonicotinoide
- **Fórmula estructural:**

Chlorantraniliprole



Thiamethoxam



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-Atención
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C
- **Formulador:** Changzhou August Agrochem Co., Ltd.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

MURETY 300 SC, es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

- Fitotoxicidad

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada en el cuadro de usos.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha		
Pimiento	Perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.25 - 0.30	7	*1.00 **0.70

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

*Chlorantraniliprole

**Thiamethoxam

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar **MURETU 300 SC** una vez por campaña por año, cuando se presenten los primeros ataques de la plaga.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Aplicar el producto en condiciones de campo abierto, no aplicar en días donde exista la posibilidad de lluvias.
- Aplicar preferiblemente en horas de la mañana.
- Aplicar siguiendo las medidas de protección tanto para el medio ambiente como para el personal que realiza aplicación.
- Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **MURETY 300 SC**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersion, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, seguir tratamiento sintomático. Consulte un médico si es necesario. Nunca administre nada por la boca ni induzca el vómito a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar en casa de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes ni semillas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.