

FICHA TÉCNICA **PLANTAC® SULFIC** (Protector Nutricional)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

Plantac® SULFIC es un fertilizante foliar que se utiliza como protector agrícola y en la nutrición foliar. Es un líquido soluble ligeramente amarillento, que se puede aplicar vía foliar o al agua de riego.

Plantac® SULFIC está compuesto por S y N, nutrientes relacionados directamente con el desarrollo vegetativo durante los primeros estadios de crecimiento de los cultivos, y ayuda a las plantas a ser más tolerante al ataque de plagas. El azufre es componente esencial de los aminoácidos, vitaminas y enzimas.

CONTENIDO:

Azufre (SO₃)	85.50 % p/v
Nitrógeno	14.00 % P/v

BENEFICIOS DE PLANTAC® SULFIC.

APLICADOS AL FOLLAJE:

- Ayuda en la síntesis de aminoácidos (cisteína, cistina y metionina) requeridos para la síntesis de proteínas.
- Ayuda en la protección de las células, ya que evita la deshidratación por calor y sequía, también juega un importante papel en la protección de los daños de las células por frío.
- Ayuda mantener la relación nitrógeno azufre para un funcionamiento normal de los cultivos.
- Ayuda al desarrollo vegetativo en los primeros estadios de crecimiento de los cultivos.
- Mantiene a los cultivos tolerantes al ataque de plagas
- Mejora la biomasa de los cereales.
- Aumenta el contenido de aceite en oleaginosas.
- Ayuda a mantener mayor uniformidad y calidad en las hortalizas.
- Ayuda en la formación de compuestos de azufre orgánicos volátiles responsables del factor lacrimonal de la cebolla y el olor particular de los ajos.

RECOMENDACIONES DE USO.

RECOMENDACIONES AL FOLLAJE:

CULTIVO		DOSIS (L/Ha)	DOSIS (L/200 L)	APLICACIONES
Hortalizas	Pimiento, Páprika, Papa, Rocoto, Ají, Tomate	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar desde el crecimiento vegetativo a la -oración
	Alcachofa	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar a partir de los 30 DDT
	Col, Coliflor	2.0-3.0	0.3-0.5	Iniciar a la formación de 3-4 hojas.
	Sandía, Melón, Zapallo	2.0-3.0	0.3-0.5	Iniciar al crecimiento vegetativo al inicio del brotamiento
	Espárrago	2.0-3.0	0.3-0.5	Iniciar solo en mezclas con pesticidas al inicio del brotamiento.
	Cebolla, Ajo	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar a los 25 DDT
Frutales	Palto, Olivo, Cítricos	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar desde el brotamiento vegetativo hasta la -oración
	Mango	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar al inicio del brotamiento hasta inicio de floración
	Vid	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar desde 5-10cm de brotes hasta el envero (uvas de mesa)
	Arándano	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar desde el brotamiento hasta cuajado
	Fresa	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar a partir de los 30 DDT
Cereales	Quinoa	2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar desde el crecimiento vegetativo hasta floración.
	Arroz	2.0-3.0	0.3-0.5	Iniciar 30 DDT hasta llenado de granos
Ornamentales		2.0-3.0	0.3-0.5	Aplicar al brotamiento de hojas

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados, por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

RESPONSABILIDAD CIVIL El titular del Producto garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.