

# FICHA TÉCNICA

## **BANNON 5P SC**

(Virus de la Poliedrosis Nuclear)

**N° de Registro: 0357-SENASA-PBA-ACBM**

**CLASIFICACIÓN:** Insecticida Biológico

### IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

**BANNON 5P SC**, es un insecticida biológico que actúa por ingestión. Los virus contaminan a los insectos por vía oral, cuando se alimentan de la planta (brotes, hojas) luego de la aplicación. La contaminación de los huevos de los insectos es posible vía interna y externa por contaminación del corium, la cual es más frecuente. La contaminación de larvas recién nacidas es facilitada por el hábito de comer el corium de los huevos.

Disolver la dosis aprobada de **BANNON 5P SC** en una cantidad reducida de agua, luego completar el resto del volumen de agua manteniendo agitación constante del caldo de aplicación. Se recomienda previo a la aplicación, acidificar el agua en un pH de 5 a 7.

Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los virus.

### COMPOSICIÓN DE TURINFIX:

Componentes	Función	Contenido
Virus de la Poliedrosis Nuclear (VPN)	Ingrediente Activo	5.0 x 10 <sup>8</sup> PIB/ml
Otros ingredientes	-	c.s.p. 1L

- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC).
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD.

### CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

No mezclar **BANNON 5P SC** con plaguicidas, surfactantes y/o fertilizantes foliares sin realizar una prueba previa de compatibilidad o consultar al departamento técnico.

- Fitotoxicidad

**BANNON 5P SC** no es fitotóxico en el cultivo que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

#### CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.4	N.A.	N.A.
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

#### FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar cuando aparezca las primeras infestaciones de la plaga previa evaluación, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

Arándano: aplicar 3 a 4 aplicaciones por campaña por año.

#### CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Para el manejo y uso de **BANNON 5P SC**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- Es recomendable usar **BANNON 5P SC**, cuando se observe los primeros síntomas a las dosis indicadas en la etiqueta, utilizando un volumen de agua que permita dar una buena cobertura de aplicación.
- Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.
- Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.
- Se recomienda que, diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 6 horas.

#### REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Se recomienda al área tratada luego que los restos de aplicación se haya secado.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **BANNON 5P SC**, no es tóxico por vía oral ni dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Utilice careta y mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C.** garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.