

FICHA TÉCNICA

BOREY

(Imidacloprid + Lambda-cyhalothrin)

N° de Registro: PQUA N° 2951-SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:


BOREY es un insecticida de doble acción, actúa de manera sistémica, de contacto o ingestión que se transloca rápidamente a través de los tejidos vegetales después de su aplicación. Posee una buena acción de choque que permite controlar plagas muy móviles. Asimismo, el efecto sistémico permite controlar insectos picadores chupadores y aquellos que se esconden dentro del tejido vegetal.

El fuerte efecto repelente del insecticida contra los insectos proporciona protección adicional al cultivo.


- **Ingrediente activo:** Imidacloprid + Lambda- cyhalothrin
- **Concentración:**

Imidacloprid	150 g/L
Lambda- cyhalothrin	50 g/L
Aditivos para completar 1 L	
- **Formulación:** Suspensión concentrada (SC)
- **Grupo Químico:** Neonicotinoide + Piretroide
- **Fórmula estructural:**

Imidacloprid



Lambda-cyhalothrin



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente Peligroso-Dañino
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C
- **Formulador:** CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM CO., LTD

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

BOREY, es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.25	7	*0.5 **0.07
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	5	*1.0 **3.0
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.25	21	*0.01 **0.2

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

*: Imidacloprid

** : Lambda- cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Aplicar **BOREY** en las etapas de mayor susceptibilidad a la plaga, como son el brotamiento, floración-fructificación, una vez por campaña por año cuando se observe los primeros ataques de la plaga. Usar un buen volumen con boquilla de cono vacío procurando mojar uniformemente el follaje y los lugares donde se encuentren las plagas.

Condiciones y método de aplicación.

- Aplicar el producto en condiciones de campo abierto, no aplicar en días donde exista la posibilidad de lluvias.
- Aplicar preferiblemente en horas de la mañana.
- Aplicar siguiendo las medidas de protección tanto para el medio ambiente como para el personal que realiza aplicación.
- Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **BOREY**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

Reingreso al área tratada.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación, siempre y cuando la superficie foliar se encuentre seca.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGRO
- Tóxico en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala
- Evita contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.