

FICHA TÉCNICA **MULSANE 500 SC** (Carbendazim 500 g/L)

N° de Registro: PQUA N° 3898-SENASA

CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

MULSANE 500 SC, es un fungicida sistémico que presenta una actividad curativa y de protección. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes con traslocación acropétala.

MULSANE® 500 SC. Actúa mediante la inhibición de los tubos germinales, la formación de apresorios y formación del micelio.

- **Ingrediente activo:** Carbendazim
- **Concentración:**

Carbendazim	500 g/L
Aditivos para completar	1.0 L
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Grupo Químico:** Benzimidazol
- **Fórmula estructural:**



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso - Cuidado.
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** JIANG YIN FUDA AGROCHEMISTRY CO., LTD.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

MULSANE® 500 SC es compatible con los agroquímicos de reacción neutra y adyuvantes más comúnmente usados. Es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivos	PLAGAS		Dosis	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	26	2.0
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	15	0.1
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	7	0.5

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar MULSANE® 500 SC, 01 aplicación por campaña como máximo, siendo una campaña al año.

Momento de aplicación: Se aplica durante el desarrollo de las hojas, aproximadamente a los 20 días de emergencia, a la iniciación de los síntomas. Número de aplicación máxima: 1 aplicación por campaña/año. Gasto de agua: 200L/ha.

En el cultivo de pimiento, se aplica durante el desarrollo vegetativo basada en la detección precoz de los primeros síntomas. Número de aplicación máxima: 1 por campaña/año. Gasto de agua: 400L/ha.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

CINNAX 780 WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido, luego aplicar

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo la asistencia de un médico.

- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- Nota: No tiene antídoto específico: El tratamiento es sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.