

FICHA TÉCNICA

TERA 480 SC

(Metribuzin)

N° de Registro: PQUA N° 3740-SENASA

CLASIFICACIÓN: Herbicida Agrícola

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

TERA 480 SC es un herbicida del grupo de las triazinonas para uso selectivo en pre y post emergencia de malezas. Actúa principalmente a través de la absorción de la raíz, translocándose de manera ascendente hacia los tallos y luego a través del xilema.


TERA 480 SC inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II durante la fotosíntesis. Afectando el crecimiento de las malezas, las que finalmente mueren.

- **Ingrediente activo:** Metribuzin
- **Concentración:** Metribuzin 480 g/L

Aditivos para completar 1 L

- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Grupo Químico:** Triazinone
- **Fórmula estructural:**

Metribuzin



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-Atención
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** ANHUI PROVINCE SHENG DAN BIOCHEMICAL CO. LTD.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

TERA 480 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

- Fitotoxicidad

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.2	60	0.1
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
Papa	Acederilla	<i>Rumex acetosella</i>	0.2	60	0.1
	Cilantro	<i>Spergula arvensis</i>			

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Realizar una sola aplicación por campaña por año. El momento de la aplicación es en la emergencia temprana, cuando las malezas presentan entre 2 a 3 hojas verdaderas.

Condiciones y método de aplicación.

TERA 480 SC se aplica en forma de aspersión foliar. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

Reingreso al área tratada.

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.