

FICHA TÉCNICA **Veclus 500 WP** (Fenhexamid)

N° de Registro: PQUA N° 1559-SENASA

CLASIFICACIÓN: Fungicida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

VECLUS 500 WP es un fungicida preventivo formado por el ingrediente activo Fenhexamid, aplicado en campo para el control de *Botrytis cinerea*.

- **Ingrediente activo:** Fenhexamid
- **Concentración:**

Fenhexamid	500 g/Kg
Aditivos para completar	1 Kg
- **Formulación:** Polvo mojable (WP)
- **Grupo Químico:** Hidroxianilidas
- **Fórmula estructural:**

Fenhexamid



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-Cuidado
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador:** SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.**COMPATIBILIDAD**

VECLUS 500 WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

VECLUS 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha		
Vid	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5	7	5
Alcachofa	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75	3	0.05

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

VECLUS 500 WP debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad y aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

No realizar más de dos aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días.

Condiciones y método de aplicación.

Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

Reingreso al área tratada.

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 12 horas del tratamiento o aplicación.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir el producto.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.