

FICHA TÉCNICA **ZAGAZO 150 OD** (Spirotetramat)

N° de Registro: PQUA N° 3430 – SENASA

CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola


IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

ZAGAZO 150 OD es un insecticida de doble sistemía, puede ser tomado por raíces y hojas, actúa como inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa (enzima responsable de la biosíntesis de ácidos grasos) de tal modo que la muda no puede completarse, el insecto no puede desarrollarse y se produce la muerte.

Controla insectos picadores chupadores como pulgones, thrips, moscas blancas, querasas.

- **Ingrediente activo:** Spirotetramat
- **Concentración:** Spirotetramat 150 g/L
Aditivos para completar 1 L
- **Formulación:** Dispersión Oleosa (OD).
- **Grupo Químico:** Tetramic acid Insecticide
- **Fórmula estructural:**

Spirotetramat



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso-4
- **Titular del Registro:** AVGUST PERU S.A.C
- **Formulador:** Changzhou August Agrochem Co., Ltd.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

ZAGAZO 150 OD, es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

- Fitotoxicidad

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivo	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	%		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.45-0.50	-	7	2.0
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	1.2	0.075	28	0.5
Vid	Cochinilla	<i>Planococcus spp</i>	0.53 - 1.29	0.075	7	2.0
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.07	1	0.4
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.45 - 0.50	-	7	1.5

P.C: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar **ZAGAZO 150 OD** en etapa de floración o formación de brotes una vez por campaña por año, cuando se presente los primeros ataques de la plaga.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

- Aplicar el producto en condiciones de campo abierto, no aplicar en días donde exista la posibilidad de lluvias.
- Aplicar el producto procurando mojar bien el follaje para una mejor absorción y que las plagas puedan ingerir la concentración tóxica.
- Aplicar preferiblemente en horas de la mañana.

- Usar equipos en buenas condiciones con boquilla de cono vacío y buen volumen de agua.
- Aplicar siguiendo las medidas de protección tanto para el medio ambiente como para el personal que realiza aplicación.
- Aplicar **ZAGAZO 150 OD** sobre tejido joven (brotes, hojas y ramas), con el fin de lograr una penetración y distribución adecuada del producto en la planta y con ello lograr su eficacia.
- Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **ZAGAZO 150 OD**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.