FICHA TÉCNICA
Magipal G
(Atrayente floral)

CLASIFICACIÓN: Atrayente

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:
Este producto es un atrayente natural para monitorear las poblaciones de diversas especies de thrips.

- **Ingrediente activo**: Aromas florales que atraen las siguientes especies: *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips fuscipennis, Thrips major, Scirtothrips dorsalis.*

- **Tiempo de duración:** 1 a 3 meses.

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO:

Componente	Especificaciones
Aromas florales	*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips fuscipennis, Thrips major, Scirtothrips dorsalis.*
Dispensador	Paquete blister sellado con lámina plateada



INSTRUCCIÓN DE USO:

Desprende con cuidado la lámina plateada del paquete blíster sin romper el sello de la película. Cuelga el atrayente en la parte superior de la trampa adhesiva y asegúralo.
Cuelga la trampa y el atrayente con la base de la trampa aproximadamente a 10 cm sobre la altura del cultivo en cultivos arbustivos u hortícolas, o a la altura de las flores en árboles frutales.

Puede combinarse con trampas adhesivas azules y amarillas, así como con las trampas de rollo Optiroll. Asegúrese de que las trampas sean claramente visibles en el cultivo, ya que los thrips son atraídos por el color y el aroma, y ambos son importantes para maximizar la captura de trampas.

Densidad de Trampas en condiciones de invernadero:

- Utilizar una trampa y señuelo por cada 100m² para monitoreo estándar. Aumentar la densidad de trampas a 1 trampa y señuelo cada 2m en áreas críticas de plagas.

Densidad de Trampas en condiciones de campo:

- Monitoreo: de 1-10 trampas/ha (Objetivo monitoreo de la plaga).
- Detección y control preventivo: 20-50 trampas por ha.
- Control: De acuerdo a la densidad de la plaga, se recomienda de 50 a 100 (Objetivo atención de focos). Recordemos que este método de control forma parte de un conjunto de acciones que forma parte del MIP.

Cuando Utilizar:

- Utilizar desde la siembra hasta la cosecha.

Reemplazo:

- Cambiar el señuelo entre 1 y 3 meses. La longevidad varía con la temperatura. Si el señuelo sigue siendo atractivo, se puede trasladar entre trampas hasta que esté agotado. Reemplazar la tabla si se llena de insectos o residuos.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco fuera de la luz solar directa, entre 8-10°C, de esta manera cuenta con una duración de 12 meses.

PRECAUCIONES:

- No coma ni beba mientras manipula este producto.
- Use guantes al manipular los señuelos de feromonas.

NOTA IMPORTANTE: AVGUST PERU S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.