FICHA TÉCNICA
ROCKROLE
(Chlorantraniliprole + Thiamethoxam)

N° de Registro: PQUA N° 3484-SENASA
CLASIFICACIÓN: Insecticida Agrícola

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:


ROCKROLE, es una mezcla de dos insecticidas: Chlorantraniliprole + Thiamethoxam

ROCKROLE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Comprende dos ingredientes activos Chlorantraniliprole que actúa en los receptores de rianodina ocasionando en los insectos letargia y parálisis muscular, lo que conlleva a la muerte del insecto. El thiamethoxam es absorbido rápidamente y transportando a toda la planta donde actúa interfiriendo la transmisión nerviosa impidiendo la alimentación de los insectos y ocasionando su posterior muerte. Chlorantraniliprole Grupo 28 -IRAC; Thiamethoxam Grupo 4-A-IRAC.


- **Ingrediente activo**: Chlorantraniliprole + Thiamethoxam
- **Concentración**:

Chlorantraniliprole	100 g/L
Thiamethoxam	200 g/L
Aditivos para completar	1.0 L

- **Formulación**: Suspensión concentrada (SC)
- **Grupo Químico**: Diamidas antranílicas (Chlorantraniliprole)
  Neonicotinoide (Thiamethoxam)
- **Fórmula estructural**:
  Chlorantraniliprole



Thiamethoxam



- **Categoría Toxicológica**: Ligeramente Peligroso - Cuidado.
- **Titular del Registro**: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
- **Importador/Distribuidor:** AVGUST PERU S.A.C.
- **Formulador**: QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

- Compatibilidad

ROCKROLE es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

- Fitotoxicidad

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivos	PLAGAS		Dosis	P.C	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	(días)	(ppm)
Arroz	Cigarrita	*Tagosodes orizicolus*	0.175 – 0.2	14	0.4* 0.01**

P.C: Periodo de Carencia.
LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar de manera foliar, previa evaluación en campo. Se recomienda aplicar **ROCKROLE** máximo una aplicación por campaña considerando una campaña al año. Máximo aplicar 0.2L/Ha. No aplicar en época de floración.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

Se recomienda aplicar ROCKROLE máximo una aplicación por campaña considerando una campaña al año.
Máximo aplicar 0.2L/Ha. **No aplicar en época de floración.**

ROCKROLE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente
previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier tipo de aplicación terrestre**.**

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
• En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca, durante al menos 15 minutos, permaneciendo con los ojos abiertos durante el lavado.
• En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
• En caso de ingestión: Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
• En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
• Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Causa irritación moderada a los ojos.
• Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
• Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



NOTA IMPORTANTE: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.