FICHA TÉCNICA

UNTICA

(Uniconazole)

N° de Registro: RCP N° 165-SENASA

CLASIFICACIÓN: Regulador de Crecimiento (RCP)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO:

UNTICA, es un regulador de crecimiento de plantas cuyo ingrediente activo es Uniconazole.
UNTICA es un regulador de crecimiento de plantas sistémico que inhibe la síntesis de giberelinas, lo que conlleva a la reducción del crecimiento vegetativo, propiciando el desarrollo de yemas florales y favoreciendo de forma indirecta el desarrollo de frutos.

• **Ingrediente activo**: Uniconazole

• **Concentración**:


	Uniconazole	50 g/L
	Aditivos para completar	1.0 L

• **Formulación**: Suspensión concentrada (SC)

• **Grupo Químico**: Triazoles

• **Fórmula estructural**:

Uniconazole



• **Categoría Toxicológica**: Ligeramente Peligroso

• **Titular del Registro**: Rainbow Agrosciences S.A.C.

• **Importador/Distribuidor**: AVGUST PERU S.A.C.

• **Formulador:** QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

• Compatibilidad

UNTICA es incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.

• Fitotoxicidad

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USO DE PRODUCTO, DE LMR Y PC.

Cultivos	Frecuencia y época de aplicación	Dosis (%)	P.C (días)	LMR (ppm)
Mango	Aplicar en inducción floral para incrementar panículas florales, número de frutos y cuajado.	0.50	35	0.01
Palto	Aplicar cuando se observe del 50% a 80% de panículas abiertas con el fin de incrementar el peso, número de frutos y cuajado.	0.50	50	0.01

P.C: Periodo de Carencia.
LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar cuando no se tenga brillo solar excesivo. Gasto de agua: 800 L/Ha (Mango) y 1000 L/Ha (Palto). Se recomienda una aplicación por campaña considerando una campaña al año para ambos cultivos.

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN.

UNTICA se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua con pH 5.0 a 6.5; luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

CUIDADOS Y PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
• En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco; dar respiración artificial de ser necesario.
• En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
• En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

• En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua; no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.
• Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• Cuidado, evite el contacto, posible CARCINÓGENO.
• Causa irritación moderada a los ojos.
• Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
• El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
• No almacenar en casa de habitación.
• No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



NOTA IMPORTANTE: Rainbow Agrosciences S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.